



! SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR.



Ekozanid 1125

Oral Tablet
Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Ekozanid 1125 Oral Tablet, kirli beyaz renkli ve ortasından çentikli bolus şeklinde olup, her tablet 375 mg Oksfendazol ve 750 mg Oksiklozanid içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Ekozanid 1125 Oral Tablet' in bileşiminde bulunan Oksfendazol, bir benzimidazol türevidir.

Oksfendazol, parazit helmintlerin enerji-üretim metabolizmalarını bozmak suretiyle antihelmintik etki gösterir. Parazitlerde fumarat redüktazın etkinliğini engelleyerek etkili olurlar. Engelleme sonucu glikoz emilmesini önler, glikojen kullanımını artırır ve ATP üretimini azaltır. Bunun sonucunda kullanılabılır enerjiden yoksun kalan parazit ölür.

Oksfendazol yavaş bir şekilde metabolize olarak vücuttan atılır. Aktif madde ve metabolitlerin vücuttan atılması yavaştır. %26 oranında idrarla, %63 oranında gaita ile atılır.

Oksiklozanid, Salisilanid türevi suda çözünmeyen bir ilaçtır. F. hepatica ve F.gigantica'nın ergin şekillerinde etkilidir.

Oksiklozanid, parazitlerde oksidatif fosforilasyonun kırılması sonucunda enerji metabolizmalarını bozarak etkir.

Oksiklozanid siğir ve koyunların sindirim kanalından iyi emilir ve 24-48 saat içinde plazmada doruk yoğunluğa erişir. Sindirim kanalı, karaciğer ve böbreklerde en yüksek yoğunluklarda birikir. Büyük ölçüde idrarla ve glukuronid bileşiği şeklinde atılır.

ENDİKASYONLARI

Ekozanid 1125 Oral Tablet, siğir ve koyunlarda mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtları, şeritler ve karaciğer kelekleri üzerinde etkilidir.

Etkili Olduğu Parazitler:

Karaciğer Kelekleri: Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica'nın ergin şekilleri ve yumurtaları

Mide bağırsak kıl kurtları: Trichostrongylus sp., Ostertagia sp., Haemonchus sp., Nematodirus sp., Cooperia sp. ve Bunostomum sp.

Trichuris ve Oesophagostomum türleri: Chabertia ovis'in ergin ve gelişmekte olan genç formları ile yumurtaları

Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus ve Dictyocaulus filaria

Şeritler: Moniezia sp.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde farmakolojik dozlar;

Koyun: 5-7,5 mg/kg canlı ağırlık Oksfendazol, 15-20 mg/kg canlı ağırlık Oksiklozanid

Siğir: 5 mg/kg canlı ağırlık Oksfendazol, 10-15 mg/kg canlı ağırlık Oksiklozanid şeklindedir.

Pratik doz;

Kuzu : ½ tablet (25 kg canlı ağırlığa kadar)

Koyun : 1 tablet (50 kg canlı ağırlığa kadar)

Buzağılar : 2 tablet (100 kg canlı ağırlığa kadar)

Danalar : 3 tablet (150 kg canlı ağırlığa kadar)

Siğirlar : 4 tablet (200 kg canlı ağırlığa kadar)

Tabletler yuturulur ya da su içinde dağıtılarak şöyle içirilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Etkili bir mücadele için iç parazit ilaçlarının aşağıda belirtilen program dahilinde kullanılması tavsiye edilmektedir:

- Biri ilkbahar ve diğeri sonbaharda olmak üzere yılda en az 2 ilaçlama,
- Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulamaya,
- Kuzuların korunması bakımından doğum sonrası bir uygulamaya,
- Ovidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından tedavi edilen hayvanların 12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Hafif nefes darlığı, hipotansiyon, defekasyon, üriyasyon gibi yan etkiler geçici olup bir-iki saat içinde kaybolur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Oksfendazol'un, trematodlara karşı bromsalanlarla birlikte kullanılmaması önerilir. Bromsalanlarla birlikte kullanıldığında siğirlarda abortlara ve koyunlarda ölümlere neden olabilirler.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Oksiklozanid koyunlara 60 mg/kg ve üzeri dozlarda uygulandığında ölüm şekillenebilir. Siğirlarda ise 30 mg/kg dozda uygulandığında bazı zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Terapötik endeksinin çok üzerinde yüksek dozlarda verildiğinde, iştahsızlık, depresyon, ataksia, yere yatma ve ayağa kalkamama, solunum hızlanması, salya artışı, spazm gibi toksik belirtiler ortaya çıkabilir, bazen ölüm olabilir. Bu durumda klinik semptomlara göre sağıtıma geçilmelidir.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen siğirlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir, ineklerden elde edilen süt 5 gün (10 sağımlı) süresince insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Aşırı karaciğer yetersizliği olan hayvanlarda kullanılması tavsiye edilmez.

Gebelikte kullanım: Benzimidazol grubu antihelmintiklerin embriyotoksik ve teratojenik etkilerinden dolayı koç katımı sırasında ve gebeliğin ilk 1/3'ünde bulunan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıdalardan uzakta bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Serin ve direkt güneş ışığından koruyarak, oda sıcaklığında (15-25 °C'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 10, 20, 50 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczane ve veteriner hekim muayenehanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 29.12.2016

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO:
17.05.2007-18/040

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ADRESİ

Ekomed İlaç Lojistik ve Turizm San. Tic. A. Ş.
Şerifali Mah. Turcan Cad. Münevver Sok. No: 10 Kat:3
Ümraniye/İstanbul

ÜRETİM YERİ VE ADRESİ

Arion İlaç San. ve Tic A.Ş.
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) 12. Cad. No:8
Tepeören-Tuzla/İstanbul