



! SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR.



Sebil

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Vitamin - Mineral

BİLEŞİMİ

Sebil Enjeksiyonluk Çözelti, opalesans beyaz renkte olup, her ml'sinde 60 mg Vitamin E, 40 mg Vitamin B₁ ve 1 mg Sodyum Selenit bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Sebil Enjeksiyonluk Çözelti, vitamin E, vitamin B₁ ve selenyumun uygun derişim ve kombinasyonlarında ve birlikte oluşturdukları koruyucu etkileri, bireysel etkilerinden daha yüksek boyutlarda olacak şekilde hazırlanmış olan bir ilaçtır.

Formülasyondaki selenyumun çoğunluğu plazma proteinlerine bağlanmış şekilde bütün vücuda dağılır. Selenyum Vitamin E ile birlikte fosfolipidlerin ve yağların peroksidasyonunu önlerler. Bunun sonucu olarak hücre membranını koruyup, hücrenin içindeki metabolik olayların düzgün bir şekilde devamını sağlarlar. Ayrıca selenyum yağların emilmesini artırır ve fertilité fonksiyonlarını düzenleyici etki gösterir. Emilen selenyum fazlası, çoğunlukla idrar yoluyla ve az bir kısmı da dışkı ve solunum havasıyla vücutu terk eder. Selenyum, vücudun ihtiyaç duyduğu iz elementlerden biridir. Selenyum normal gelişme ve döllenme için gereklidir ve evcil hayvanlardaki birçok dejeneratif bozuklukların önlenmesi ve sağaltımında etkilidir.

E vitamini, emildikten sonra geniş ölçekte bütün vücut dokularına dağılır ve hayvanları uzun süre koruyabilecek düzeyde dokularda birikir. E vitamininin en önemli biyolojik görevi yükseltgenmeyi engelleme ve serbest oksijen gruplarını etkisizleştirme temeline dayanır. Vitamin E aynı zamanda fagosit hücrelerinin ve lökositlerin yaşamını uzatır, prostaglandin E, fosfolipid, immunglobulin sentezini etkiler. Gereklerinden fazla olarak emilen veya depolanabilen miktardan fazla olan E vitamini başlıca safra yoluyla ve daha az oranlarda da idrarla atılır.

Sebil, formülasyonuna yeni doğmuş ruminantlarda rumenini gelişmemiş olması sebebiyle B₁ vitamininin eksikliğinin oluşturacağı güçsüzlük, çırpınma, felçlerin ve bacaklardaki hareket düzensizliklerinin önlenmesi, ayrıca Selenyum ve Vitamin E'nin biyolojik etkilerini kolaylaştırıcı etki sağlaması için Vitamin B₁ de ilave edilerek daha uygun hale getirilmiştir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Selenyum ve Vitamin E'den fakir veya yoksun yemlerle beslenen gebe hayvanların yavrularında ortaya çıkan beyaz kas hastalığı ve kas distrofilerinin tedavisinde ve korunmada kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde deri altı ve kas içi olarak pratik doz aşağıdaki tabloya göre uygulanır. Ürün kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır ve vücut ısısına yakın olmalıdır.

| | TEDAVİ AMAÇLI | KORUYUCU AMAÇLI |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| Buzağı | 2-4 ml | 1-2 ml |
| Kuzu ve oğlak | 0.5-2 ml | 0.5-2 ml |
| (1 haftalık) | | |
| Kuzu ve oğlak | 2 ml | 1 ml |
| (1 hafta 1 ay) | | |
| Koyun ve keçi | - | 1-2 ml |
| (gebeliğin 3. ayından itibaren) | | |
| İnek ve kısrak | - | 12-16 ml |
| (Gebelığın 5. ayından itibaren) | | |
| Kedi ve köpek | - | 0.2-2 ml |

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR

Sürülerde selenyuma karşı aşırı duyarlık olabilir. Bunun için sürüden birkaç kuzuya ön deneme yapıp gözlenmeli ve sürünün tamamına ondan sonra ilaç tatbik edilmelidir. Duyarlı hayvanlara 2 gün boyunca yarı doz uygulanabilir. Selenyum zehirli bir madde olup, terapötik dozlar aşılmalıdır. Ürün iki haftalık aralıkla ile en çok dört kez uygulanır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Nadiren de olsa özellikle sigırlarda hipersensitivite reaksiyonu şekillenebilir. Böyle durumlarda semptomatik tedavi uygulanır. Enjeksiyon bölgesinde kendiliğinden geçen az bir iritasyon şekillenebilir.



! SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR.



İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Spesifik bir antidotu yoktur. Yüksek dozlarda, solunum sayısında artış ve solunum güçlüğü, taşikardi, ishal, davranış bozuklukları ve kolaps görülür. Semptomatik tedavi uygulanır.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Et ve Süt için "0" gündür.

KONTRENDİKASYON

Önerilen dozlarda bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Serin ve direkt güneş ışığından koruyarak, rutubetsiz yerde oda sıcaklığında (15-25 °C'de) saklayınız. Açılmış ürünler 4 hafta içinde tüketilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20 ml, 50 ml ve 100 ml'lik Tip II amber renkli cam şişelerde sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 12.07.2010

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİH VE NO: 31.12.2003-13/019

PAZARLAMA İZİNİ SAHİBİ VE ADRESİ:

Ekomed İlaç Lojistik ve Turizm San. Tic. A. Ş.
Şerifali Mah. Turcan Cad. Münevver Sok. No: 10 Kat:3
Ümraniye/İstanbul

ÜRETİM YERİ:

Arion İlaç San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) 12. Cad. No:8
Tepeören-Tuzla/İstanbul