



SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR.



Sebil

BİLEŞİMİ

Sebil Enjeksiyonluk Çözelti, opalesans beyaz renkte olup, her ml'sinde 60 mg Vitamin E, 40 mg Vitamin B1 ve 1 mg Sodyum Selenit bulunur.

FAARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Sebil Ennjeksiyonluk Çözelti, vitamin E, vitamin B1 ve selenyumun uygun derişim ve kombinasyonlarında ve birlikte oluşturdıkları koruyucu etkileri, bireysel etkilerinden daha yüksek boyutlarda olacak şekilde hazırlanmış olan bir ilaçtır.

Formülasyondaki selenyumun çoğunluğu plazma proteinlerine bağlanmış şekilde bütün vücuda dağılır. Selenyum Vitamin E ile birlikte fosfolipidlerin ve yağların peroksidasyonunu önlerler. Bunun sonucu olarak hücre membranını koruyup, hücrenin içindeki metabolik olayların düzgün bir şekilde devamını sağlarlar. Ayrıca selenyum yağların emilmesini arttırır ve fertilitte fonksiyonlarını düzenleyici etki gösterir. Emilen selenyum fazlası, çoğunlukla idrar yoluyla ve az bir kısmı da dışkı ve solunum havasıyla vücutu terk eder. Selenyum, vücudun ihtiyaç duyduğu iz elementlerden biridir. Selenyum normal gelişme ve dolllenme için gereklidir ve evcil hayvanlardaki bir çok dejeneratif bozuklukların önlenmesi ve şağaltımında etkilidir.

E vitamini, emildikten sonra geniş ölçelerde bütün vücut dokularına dağılır ve hayvanları uzun süre koruyabilecek düzeyde dokularda birikir. E vitamininin en önemli biyolojik görevi yükseltgenmeyi engelleme ve serbest oksijen gruplarını etkisizleştirme temeline dayanır. Vitamin E aynı zamanda fagosit hücrelerinin ve lökositlerin yaşamını uzatır, prostaglandin E, fosfolipid, immunglobulin sentezini etkiler. Gereksinimden fazla olarak emilen veya depolanabilen miktardan fazla olan E vitamini başlıca safra yoluyla ve daha az oranlarda da idrarla atılır.

Sebil, formülasyonuna yeni doğmuş ruminantlarda rumenin gelişmemiş olması sebebiyle B1 vitamininin eksikliğinin oluşturacağı güçsüzlük, çırpınma, felçlerin ve bacaklardaki hareket düzensizliklerinin önlenmesi ayrıca Selenyum ve Vitamin E'nin biyolojik etkilerini kolaylaştırıcı etki sağlaması için Vitamin B1 de ilave edilerek daha uygun hale getirilmiştir.

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Vitamin - Mineral

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Selenyum ve Vitamin E'den fakir veya yoksun yemlerle beslenen gebe hayvanların yavrularında ortaya çıkan beyaz kas hastalığı ve kas distrofilerinin tedavisinde ve korunmada kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, aşağıdaki doz tablosuna göre deri altı (SC) ve kas içi (IM) olarak uygulanır. Ürün kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır ve vücut ısısına yakın olmalıdır.

Hayvan Türü	Tedavi Amaçlı	Koruyucu Amaçlı
Buzağı	2-4 ml	1-2 ml
Kuzu ve oğlak (1 haftalık)	0,5-2 ml	0,5-2 ml
Kuzu ve oğlak (1 hafta 1 ay)	2 ml	1 ml
Koyun ve keçi (gebeliğin 3. ayından itibaren)	-	1-2 ml
İnek ve kısrak (gebeliğin 5. ayından itibaren)	-	12-16 ml
Kedi ve köpek	-	0,2-2 ml

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR

Sürülerde selenyumla karşı aşım duyarlık olabilir. Bunun için sürülen birkaç kuzuya ön deneme yapıp gözlenmeli ve sürünün tamamına ondan sonra ilaç tatbik edilmelidir. Duyarlı hayvanlara 2 gün boyunca yarı doz uygulanabilir. Selenyum zehirli bir madde olup, terapötik dozlar aşımamalıdır. Ürün iki haftalık aralıkla ile en çok dört kez uygulanır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Nadiren de olsa özellikle sığırlarda hipersensitivite reaksiyonu şekillenebilir. Böyle durumlarda semptomatik tedavi uygulanır. Enjeksiyon bölgesinde kendiliğinden geçen az bir iritasyon şekillenebilir.



SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR.



İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDÖT

Spesifik bir antidotu yoktur. Yüksek dozlarda, solunum sayısında artış ve solunum güçlüğü, taşikardi, ishal, davranış bozuklukları ve kolaps görülür. Semptomatik tedavi uygulanır.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (İ.K.S.S): Et ve Süt için "0" gündür.

KONTRENDİKASYON

Önerilen dozlarda bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Serin ve direk güneş ışığından koruyarak, oda sıcaklığında (15-25 °C'de) saklayınız. Açılmış ürünler 4 hafta içinde tüketilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20 ml ve 100 ml'lik Tip II amber renkli cam şişelerde sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenahanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 12.07.2010

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 31.12.2003-13/019

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Ekomed İlaç A.Ş.
Şerifali Mahallesi Turcan Caddesi Münvevver Sokak No: 10
Kat: 3 34775 Ümraniye / İstanbul
www.ekomedilac.com

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ:

Arion İlaç San. ve Tic. A.Ş.
İTOSB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) 12. Cad. No: 8
34959 Tepeören - Tuzla / İstanbul